



## Rokketænder

Omkring 6 års alderen begynder de første mælketænder at blive løse. Det er typisk de små tænder foran i undermundens, der bliver først løse. Barnet mærker det måske tilfældigt, når der spises, eller der skal børstes tænder. Det er for de fleste børn en stor ting at opdage den første rokketand. Måske har barnet allerede hørt om tandfeen fra nogle større børn.

Hvorfor bliver tænderne løse?

Mælketænder har rødder ligesom de blivende tænder.

Når de nye (blivende) tænder dannes, ligger de nede i kæben på den side af mælketandens rod, som vender ind mod tungen. Efterhånden som der dannes mere og mere af den nye tand, begynder den at skubbe sig ud. Det medfører, at mælketandens rod bliver kortere og kortere, den bliver populært sagt spist af den nye tand. Til sidst er mælketandens rod så kort, at tanden bliver løs og falder ud.

Rokketænder kan godt blive lidt ømme, når de bliver meget løse. Der er kun en ting, der hjælper på dette, nemlig at få dem pillet ud. Hvis barnet ikke selv kan få en mælketand rokket ud, kan barnet få hjælp af en voksen, og hvis tanden ikke falder ud som normalt, hjælper vi gerne på klinikken.



”Vil du se min rokketand?”