



## Rokketænder

Omkring 6 års alderen begynder de første mælkætænder at blive løse. Det er typisk de små tænder foran i undermundens, der bliver løse først. Barnet mærker det måske tilfældigt, når det spiser, eller der skal børstes tænder. Det er for de fleste børn en stor ting at opdage den første rokketand. Måske har barnet allerede hørt om tandfeen fra nogle større børn.

### Hvorfor bliver tænderne løse?

Mælkætænder har rødder ligesom de blivende tænder.

Når de nye (blivende) tænder dannes, ligger de nede i kæben på den side af mælkætandens rod, som vender ind mod tungen. Efterhånden som der dannes mere og mere af den nye tand, begynder den nye tand at vokse sig ud. Det medfører, at mælkætandens rod bliver kortere og kortere, den bliver populært sagt spist af den nye tand. Til sidst er mælkætandens rod så kort, at tanden bliver løs og falder ud.

Rokketænder kan godt blive ømme, når de bliver meget løse. Der er kun en ting, der hjælper på dette, nemlig at få dem pillet ud. Hvis barnet ikke selv kan få en rokketand ud, kan det være en fordel at få hjælp af en voksen.

Hvis tanden ikke falder ud på normal vis, hjælper vi gerne på klinikken.

